

INKASUN IR

Maturitate semitardiva | Tehnologie IMI



- Foarte buna toleranță față de Botrytis și Sclerotinia la calatidiu
- Hibrid de generație nouă recomandat pentru sisteme de producție intensivă
- Foarte bună stabilitate a producțiilor inclusiv în zonele de cultură infestate cu Orobanche spp.



CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Precocitatea înfloririi	mijlocie
Precocitatea recoltării	semi-tardiv
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	122 - 124 zile
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire)	63-65 zile
Înălțimea plantei	medie-înaltă / 220 cm
Diametrul calatidiului (cm)	24
Forma calatidiului	pronunțat convexă
Poziția calatidiului	aplecat cu tija curbată
Masa hectoltrică (kg/hl)	41
Masa a o mie de boabe (grame)	62
Conținut de ulei (%)	37-41
Conținut de acid oleic	scăzut

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Vigoare la pomirea în vegetație	foarte bună
Toleranța față de secetă	foarte bună
Rezistența la înclinare și frângere	foarte bună
Rezistanța la frângerea tije sub calatidiu	buna
Rezistența la scuturare	bună
Potențial de producție	ridicat
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară)	foarte bună
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară)	foarte buna
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu	foarte buna
Toleranța față de Sclerotiniala colet	buna
Toleranța față de Phomopsis	medie
Toleranța față de Botrytis	foarte buna
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie)	nerezistent

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări Recomandat in toate zonele de cultură a florei soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobanche spp. cu condiția aplicării s.a. imazamox cu doza completă în stadiul de 6-8 funze al florei soarelui

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Tehnologia de cultură Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox.

Norma de semănare
în condiții de neirigat 50.000 - 55.000 plante / ha

Norma de semănare
în condiții de irigat 60.000 - 65.000 plante / ha

DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com